



Kindlad valikud 2022 hooajaks



Karel Kaldoja



Euroopa Maelu Arengu
Põllumajandusfond:
Euroopa investeeringud
maapirkondadesse



Herne ja põldoa umbrohutõrje



- **Umbrohud:** üheaastaste kaheiduleheliste ja mõnede kõrreliste umbrohtude tõrjeks
- **Toimeaine:** aklonifeen 600 g/l
- **Toimeviis:** mõjub mulla ja roheliste taimeosade kaudu.
- **Hernes/Uba:** külvijärgselt (tärgamiseelselt) kulunorm **3,0 l/ha**

VEEKULU 250-350L/ha





Herne ja põldoa haigustõrje

Toimeained:

125 g/l Protiokonasool

125 g/l Fluopüraam

Kulunorm: 0,8 – 1,0 l/ha

Pritsimise aeg:

Alates põldoa ja põldherne
varre pikkuskasvust kuni
õitsemise lõpuni (BBCH30-69)

Intervalliga 14 päeva, hooajal kuni 2x





Herne ja põldoa haigustõrje



- Šokolaadilaiksuse – kiire levikuga!
- Laikpõletik ja šokolaadilaiksus vajavad arenguks niiskust ja soojust.
- Võimalus kasutada esimeste haigustunnuste ilmunisel 0,5 l/ha oal ja õitsemise lõpus kaunade kaitseks laikpõletiku vastu teine 0,5 l/ha
- Fungitsiid aitab ka hernel paremini lamandumist vältida
- Haigustõrje puudumine võib valgemädaniku ka rapsile edasi kanda





Kasvuregulaatori ja haigustõrje tipptase rapsile

PROPULSE[®] TilmOR[®]




TilmOR[®]



PROPULSE[®]



Kevadine kasvureguleerimine



Tilmor®

- ← Külgvõrsed kasvavad jõudsalt
- ← Taim võtab vastu rohkem päikest
- ← Öitsemine ja valmimine ühtlustub
- ← Toitained tarbitakse maksimaalselt
- ← Suureneb põuakindlus
- ← Taimed on lamandumiskindlad
- ← Suurem saak



Fomoosikaitse TILMORIGA 1,0 l/ha



TilmOR®





Kindel valik valgemädaniku ja kuivlaiksuse tõrjeks rapsil !

//Efektiivsus:

Propulse® kaitseb tõhusalt rapsi taime, takistades
kõtrade ja seemnete nakkumist haigustest.

Kulunorm: 1,0 l/ha

//Kasutamine:

**Paindlik pritsimisaeg valgemädaniku tõrjel –
roheliste õienuppude staadiumist kuni õitsemise lõpuni
(BBCH 57-69)**

Lisasaak +35%, tugeva valgemädaniku nakkuse korral





Teraviljade T1 haigustõrje





INPUT ja INPUT TRIPLE – tugev vundament teraviljahaiguste tõrjeks






INPUT perekond



	0,75 l/ha	0,8-1,0 l/ha
Kulunorm		
Jahukaste	XXX	XX
Silmlaiksus ja vörsehaigused	XX	XXX
Mõjuaeg	3 nädalat	4 nädalat



Input 1 l/ha



48 DAA



INPUT

Input 1 l/ha





INPUT[®]



INPUT[®]
Triple

Peagi on taas
KEVAD!

Kindel LAHENDUS
varakult levivate haiguste tõrjeks

Bixafen + protiokonasool =

Xpro™

1+1=3

15 minutit pärast pritsimist on **rohkem kui 70%** toimeainetest taimelehtedesse täielikult imendunud

3 nädalat + 14 päeva efektiivset toimet - uue põlvkonna Xpro fungitsiidid tagavad pikemaajalise haigustõrje ja vitaalsemad taimed

Rohelisemad taimed, see tähendab pikemat tera täitumise aega

+ 10 % enamsaaki - sõltuvalt sordist, kasvatustehnoloogiast ja mullastikust





Ascra Xpro™

eelised



Vajalik, sest

- Tõhusaim haiguste vastu
- Garanteerib suurima lisasaagi
- Kõige laiem toimespekter
- Kiirem mõju – stopp-efekt
- Paindlikum kasutusaeg
- Toimib tõhusalt ka resistentsete seene populatsioonide vastu

Kulunorm : **0,6-1,2** l/ha (**oder**/kaer)

Kulunorm : **0,75-1,5** l/ha (**nisu**/tritikale)

Toimeained kindlustavad:

- **BIKSAFEEN**: rohendav mõju, saagitõus
- **FLUOPÜRAAM**: kiire toime, stopp-efekt
- **PROTIKONASOOL**: pikaajaline mõju, kompleksne kaitse
- ✓ Parim **nisu-pruunlaiksuse** tõrjumiseks!
- ✓ Odral selgelt parim toime **võrklaiksuse** ja **ramulaaria** vastu!





Tugev ja terve taimik





Fungitsiidide ajastamine viljapeade kaitseks

PROSARÖ[®]

• Toimeained:

- Protiokonasool 125 g/l + tebukonasool 125 g/l

• Kultuurid

- Tali- ja suvinisu
- Tali- ja suvioder
- Rukis, tritikale
- Tali- ja suviraps ja -rüps

• Haigused

- lehti ja viljapead kahjustavad haigused teraviljal
- lehti, varsi ja kõtrasid kahjustavad haigused rapsil


- **Kulunorm** 0,75 – 1,0 l/ha





Fungitsiidide ajastamine viljapeade kaitseks

Viljapeade kaitsmine ja terakvaliteedi hoidmine



Vara
Õitsemiseelne

Õige ajastus
Õitsemise alfaas

Hilja
Õitsemise lõppfaas






Haigustõrje TALINISUL

// Bayer'i kindlaim soovitus
2022.aasta taimekasvuhooajaks



0,8 – 1,0 l/ha



Vajadusel!
Prosaro või Folicur viljapeade kaitseks

Ascra[®]
Xpro

0,8 – 1,2 l/ha

INPUT[®]
Triple

0,75 l/ha



Haigustõrje TALIODRAL

// Bayer'i kindlaim soovitus
2022.aasta taimekasvuhooajaks



0,8 l/ha



0,75 l/ha




0,6-1,0 l/ha



Haigustõrje ODRAL

// Varajane suvioder

INPUT[®]
Triple
0,75 l/ha





Haigustõrje ODRAL

// Suviuder, jagatud pritsimine

INPUT[®]
Triple
0,75 l/ha



Ascra[®]
Xpro
0,6-0,8 l/ha



Kandke kemikaalikindlaid kindaid ja kaitsülikonda! Need on kõige odavamad ja kõige tõhusamad viisid tervise kaitsmiseks taimekaitsevahenditega töötamisel – seda nii taimekaitsepritsi täitmisel, puhastamisel kui ka hooldustööde ajal.



Kasutage õigete filtritega kaitsemaske! Valige mask, mis sobib konkreetsete vahenditega töötamiseks!



Hoiustage taimekaitsevahendeid ettenähtud tingimustele vastavas lukustatavas laos ning tagage, et võimalik pole volitamata isikute ja ka loomade juurdepääs.



Loputage tühi taimekaitsevahendite taara vähemalt kolm korda puhta veega ja loputusvesi lisage valmistatavasse töölahusesse. Loputatud taara muuta kasutuskõlbmatuks ja utiliseerida korrektselt.



Insektitsiidide kasutamisel järgige kõiki ettekirjutusi, mille rakendamine tagab kasulike putukate ohutuse!



Järgige täpselt taimekaitsevahendite kasutusjuhendeid! Võtke arvesse ettenähtud ooteaega ja tööoodet!

Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.
Pöörake erilist tähelepanu toote etikettil olevatele hoiatussümbolitele ja -lausetele.
Järgige kõiki soovitatud ohutusabinõusid.

Hädaabi telefon: 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.



AITÄH!

*Edu ja kindlaid valikuid
2022 hooajaks!*

