



syngenta

KEVILI 2022

Kaupo Suik 25.01.2022



Euroopa Maaelu Arengu
Põllumajandusfondi
Euroopa investeeringud
maaspirkondadesse



Syngenta 2021/2022

- 2021 aasta oli parem, kui oskasime mõelda
- Uus koostöövorm kooperatiividega, KEVILI, VAKS, LATRAPS
- 2022 väljakutsed
 - Tarneahelad
 - Planeerimine
 - Looduskatastroofid
 - Energia
 - Globaalne nõudlus
 - ???

Puhtimine

 **Vibrance[®] Pro**

 **Vibrance[®] Duo**

 **Maxim[®] 025FS**
Formula M


 **Celest[®] Trio**
Formula M

- kvaliteet
- norm toode/vesi
- seemnematerjali kvaliteet
- kultuur/toode
- biostimulandid
- kvaliteedi kontroll
- suurem taimik (juured +30%, lehed +44%, võrsumine 17%)
- Celest Trio – loa kehtivus 31.08.2023

Herbitsiidid



- + **Legacy 500 SC** (diflufenikaan 500 g/l)
 - võib tekitada klorootilisi laiike
 - tugevamalt odral, kuna on tundlikum
 - SYN soovitus – peale külvi ja enne tärkamist
 - parem mõju rukki-kasteheinale, murunurmikale
 - Boxer 800 EC **2,0 L/ha** + Legacy 500 EC **0,1-0,15 l/ha**
- + **Mateno Duo** (aklonifeen 500g/l; diflufenikaan 100 g/l)
 - spektri laiendamiseks kaheidulehelistele umbrohtudele
 - Boxer 800 EC **2,0 L/ha** + Mateno Duo **0,35 l/ha**
 - ajastus külv > BBCH 11 (esimese lehe staadium)
 - talinisu/ tritikale – sobib
 - talioder/ rukis – **ei sobi**



HTWW05BD-2021LT BOXER

CHECK



HTWW05BD-2021LT BOXER

Boxer 2 l/ha



HTWW05BD-2021LT BOXER

Boxer 2 l/ha + Legacy 0.12 l/ha



HTWW05BD-2021LT BOXER

Boxer 2 l/ha + Mateno Duo 0.35 l/ha



Herbitsiidid



Norm vastavalt umbrohtudele (BBCH 13-39)

- Tuulekaer **0,6...0,8 l/ha**
- Rukki-kastehein **0,8...1,0 l/ha**
- Raiheinad **1,0 l/ha**
- Rebasesaba **1,2 l/ha**
- Võimalikud segupartnerid laialeheliste umbrohtude tõrjeks (järgida Eestis registreeritud norme)
- Biathlon 4D, Zypar, Starane XL, Elegant
- **Kui kõrreliste umbrohtude probleem on suur, siis on soovitatav teha pritsimised eraldi, 5-7 päeva!**
- **Põhjavee kaitsmiseks on lubatud ainult kevadine kasutus.**

Segamine

- AXIAL 50 võib segada **nisul** kasvuregulaatoritega (CCC, MODDUS®, MODDUS START™) kuni kasvufaasini **BBCH 32** (II kõrresõlm).
- Peale seda kasvuregulaatori ja AXIAL 50 pritsimise vahele jätta vähemalt 5-päevane ajavahe.
- Mitte segada *proheksadioonkaltsium* sisaldavate toodetega!
- Segatav nii insektsiidide kui ka fungitsiididega
- **Oder- on erinevate segude suhtes tundlikum, täpsustada edasimüüjaga! Segusid pigem vältida!**



- Norm 1,35...1,8 l/ha
- Aeg BBCH 22-32
- Registreeritud nisu, rukis, tritikale
- Kaheidulehelised ja kõrrelised (lusted) umbrohud

Herbitsiidid



Klomasoon/ kloroos

Erinevad normid

- Teridox 2,0 l/ha (BBCH 00-14 tärkamise lõpuni)
- Brasan 2,0 l/ha (BBCH 00-09 peale külvi, enne tärkamist)
- Või 1+1 (enne tärkamist)



Erinevad normid

- Orashein, nurmikad 1,0...1,5 l/ha
- Teravili võõrkultuurina 0,5...1,0 l/ha
- Harilik nurmikas 1...3 pärislehte 1,0...1,5 L/ha
- Kasutusaeg ei sõltu kultuuri kasvufaasist
- Hästi segatav enamlevinud insektitsiidide, fungitsiidide ja lehevätistega (B, Mg, S)
- **Ei tohi segada laialeheliste umbrohtude tõrjeks mõeldud toodetega! Tööoode 5 päeva.**

Kasvuregulaatorid



Erinevad tooted, sama toimeaine

- MS varajaseks kasutamiseks
- Temperatuur ja CCC
- Juurestiku areng ja rohendav mõju
- Kasvu reguleerimine ja kõrreseinena paksenemine
- Paindlik segupartner, ajastus ja normid



Erinevad kasutusajad, **taliraps**

- Sügisel, norm **0,3 l/ha**, aeg 3-4 lehte
- Kasvu reguleerimine ja tugev kaitse haiguste vastu (fomoos, tsülindrosporioos)
- Kevadel, norm **0,35...0,4 l/ha**, aeg varsumise algus
- Külgvõrsete areng ja kaitse haiguste vastu
- Hästi segatav enamlevinud insektitsiidide ja lehevätistega (B, Mg, S)

Insektitsiidid



Kontaktne ja söötmürk

- Teraviljad, raps, hernes, hoidlad
- Norm 0,1...0,2 l/ha, hoidlad 0,4 ml/m²
- SPe8 – keelatud kasutada õitsvatel põllumajanduskultuuridel ja umbrohtudel
- Segatav fungitsiidide ja insektitsiididega
- Kasutuskordade arv 1



Kiiretoimeline kontaktne insektitsiid

- Registreeritud paljudel kultuuridel
- Norm 0,15...0,2 l/ha, kasutuskordade arv 1-2
- Evure on lubatud kasutada taimede õitsemise ajal! Pritsitakse hommiku- ja õhtutundidel, kui mesilaste ja teiste kasulike putukate lendlus pole alanud või on lõppenud (kell 22:00-05:00)
- Hästi segatav enamlevinud fungitsiidide ja leheväetistega

Fungitsiidid



Suvi – ja talirapsil

- Suviraps 0,75 l/ha
- Taliraps 1,0 l/ha
- Tõrjub valgemädanikku, kuivlaiksust, fomoosi, hahkhallitust ja tsülindrosporioosi
- Kasutamine, õitsemise algus BBCH 60



Teraviljadele



- Elatus Plus (bensovindiflupüür 100g/l) + Plexeo (metkonasool 90 g/l)
- Võimalus kooperatiividele (EE, LV)
- Norm 0,5 + 0,5 l/ha
- Elatus Era (bensovindiflupüür 75 g/l, protiokonasool 150 g/l)
- Norm 0,7...0,8 l/ha

MOTIVATSIOONIKAMPAANIA 2022

Kokku üle 30 erineva auhinna!



Syngenta Eestis



KAUPO SUIK
Müügijuht

Tel: +372 51 44 011

kaupo.suik@syngenta.com



KADRI LEETBERG
Müügiesindaja

Tel: +372 56 646 380

kadri.leetberg@syngenta.com



JAANIKA KOZLOVA
Registreerimistugi ja turundus

Tel: +372 50 11 930

jaanika.kozlova@syngenta.com